

# Обобщение инфинитезимального оператора в групповом анализе ОДУ

*Л.В. Линчук*

(Санкт-Петербург, СПбГПУ; lidiya\_linchuk@mail.ru)

Хорошо известно, что основой классического группового анализа послужило понятие локальной непрерывной однопараметрической группы точечных преобразований на плоскости. Однако эффективный алгоритм поиска таких групп был построен только после перехода к бесконечно-малым преобразованиям и введения линейного инфинитезимального оператора. Оказывается, что если не требуется “размножения” частного решения уравнения по группе, то мы можем не искать конечную группу, ограничиваясь поиском допускаемого оператора. Для точечных операторов

$$X = \xi(x, y)\partial_x + \eta(x, y)\partial_y \quad (1)$$

их координаты могут быть найдены в явном виде и, как правило, уравнение для определения инварианта интегрируется. В свою очередь, знание инварианта позволяет привести исходное уравнение к автономному виду или записать его в инвариантах (и то, и другое приводит к понижению порядка исходного уравнения).

Дальнейшее развитие группового анализа привело к появлению обратных задач, т.е. к поиску классов уравнений, обладающих заданной симметрией. Если симметрию задать набором инвариантов, то можно описать весь класс уравнений, факторизующихся через эти инварианты. Естественно, возникает вопрос, какой оператор соответствует этим инвариантам. В результате оказывается, что класс допускаемых операторов должен быть существенно расширен, например, для уравнений второго порядка – до экспоненциальных нелокальных операторов (ЭНО) вида

$$X = \exp\left(\int \zeta(x, y, y') dx\right) [\xi(x, y)\partial_x + \eta(x, y)\partial_y]. \quad (2)$$

Выражение  $\exp\left(\int \zeta(x, y, y') dx\right)$ , вообще говоря, содержит производные сколь угодно высокого порядка.

В общем случае при определении координаты канонического оператора мы сталкиваемся с решением уравнения в “полных производных”, например, для уравнения второго порядка  $F(x, y, y', y'') = 0$

$$\Phi \frac{\partial F}{\partial y} + D_x \Phi \frac{\partial F}{\partial y'} + D_x^2 \Phi \frac{\partial F}{\partial y''} \Big|_{[F]} = 0 \quad (3)$$

(операторы  $\Phi \partial_y$ , определяемые решениями таких уравнений, получили название формальных).

Заметим, что при поиске операторов классический алгоритм предполагает явное аналитическое представление структуры координат операторов – через элементарные функции. Проводя аналогию со структурой точных решений обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), можно считать, что локальные операторы представимы через элементарные функции, а нелокальные – через “квадратуры” от них. Продолжая эту аналогию, можно расширить набор “допустимых” функций, включив в него всевозможные решения линейных уравнений с переменными коэффициентами, в качестве некоторых специальных функций. Тогда возникает возможность использования произвольных формальных операторов.

Как известно, решения большинства линейных ОДУ ищутся в виде разложения, например, в обобщенные степенные ряды. В групповом анализе также неоднократно предпринимались попытки расширения набора “допустимых” функций путем определения координат операторов в виде некоторых разложений в ряд (например, по производным). Однако сколько-нибудь удовлетворительного алгоритма для решения этой задачи так и не было найдено.

Но если для приложений ОДУ нам, как правило, требуется явное представление решения, то для факторизации ОДУ в групповом анализе нам требуется не знание самого оператора в явном виде, а знание его инвариантов. Рассмотрим процедуру факторизации некоторого конкретного исходного ОДУ

$$y^{(n)} = F(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (4)$$

с помощью формального оператора

$$X = \Phi \partial_y. \quad (5)$$

Для этого мы должны найти формальный оператор (5), допускаемый уравнением (4), решив определяющее уравнение

$$\Phi \frac{\partial F}{\partial y} + D_x \Phi \frac{\partial F}{\partial y'} + \dots + D_x^{n-1} \Phi \frac{\partial F}{\partial y^{(n-1)}} - D_x^n \Phi \Big|_{[y^{(n)}=F]} = 0. \quad (6)$$

Если нам удалось найти  $\Phi$  в явном аналитическом виде, мы переходим к вычислению инвариантов допускаемого оператора (5). Инварианты удовлетворяют уравнению

$$\Phi \frac{\partial J}{\partial y} + D_x \Phi \frac{\partial J}{\partial y'} + \dots + D_x^{n-1} \Phi \frac{\partial J}{\partial y^{(n-1)}} \Big|_{[y^{(n)}=F]} = 0. \quad (7)$$

Выберем из найденного множества решений уравнения (7) решение  $J = J(x, y, y', \dots, y^{(k)})$ , ( $k < n$ ), старшая производная в котором имеет наименьший порядок (этот инвариант называется младшим). Тогда исходное уравнение (4) можно записать в виде факторсистемы

$$\begin{cases} u = J(x, y, y', \dots, y^{(k)}), \\ u^{(n-k)} = G(x, u, u', \dots, u^{(n-k-1)}). \end{cases} \quad (8)$$

Заметим, что уравнения (6) и (7) имеют схожую структуру, а именно, в них линейно входит функция  $\Phi$  и ее полные производные, с той лишь разницей, что в уравнении (6) функция  $\Phi$  является искомой, а в уравнении (7) считается известной. Если поделить эти уравнения почленно на  $\Phi$ , получим выражения, в которые функция  $\Phi$  входит лишь в виде отношений

$$\frac{D_x \Phi}{\Phi}, \frac{D_x^2 \Phi}{\Phi}, \dots, \frac{D_x^n \Phi}{\Phi}.$$

Следовательно, для поиска факторсистемы нам достаточно знать эти отношения, а не искать собственно функцию  $\Phi$ . Более того, достаточно знать лишь первое отношение, так как остальные могут быть получены из него простым дифференцированием.

Если, например, отношение  $D_x \Phi / \Phi = \zeta(x, y, y')$ , то мы получаем определение ЭНО в каноническом виде

$$X = \exp \left( \int \zeta(x, y, y') dx \right) \partial_y.$$

В данном случае мы восстанавливаем явный вид функции  $\Phi$  (квадратурой), хотя для факторизации, как мы показали, это не принципиально, и вид оператора не имеет значения ни для прямой, ни для обратной задачи, а ключевую роль играет выражение  $D_x \Phi = \zeta(x, y, y') \Phi$ , которое можно назвать **правилом дифференцирования** функции  $\Phi$ .

Идея задания координаты канонического оператора в неявном виде через правило дифференцирования этой координаты лежит в основе предлагаемого метода.

Для изложения этого метода нам потребуется понятие нелокальной переменной. Изначально под нелокальной переменной понималось выражение вида

$$\exp \left( \int \zeta(x, y, y', \dots, y^{(m)}) dx \right),$$



Если эта система имеет только тривиальное решение, то найденный оператор оказывается пустым с точки зрения факторизации, в противном случае можно построить факторсистему (8).

Естественно, сразу же возникает вопрос, сколько нелокальных переменных нужно брать для задания оператора (8) и каков порядок производных  $p$  должен быть в соотношениях (9) и (10), чтобы этой формы оператора было достаточно для построения всех факторсистем заданного ОДУ, а алгоритм не был технически громоздким. Практические исследования показали, что число нелокальных переменных и порядок производных  $p$  должен быть меньше порядка уравнения  $n$ , для которого ищется допускаемый оператор. Более того, координату оператора  $\Phi$  можно считать равной одной из нелокальных переменных.

Так, для ОДУ 2-го порядка целесообразно вводить только одну нелокальную переменную и ограничиться рассмотрением операторов вида

$$X = A\partial_y, \quad \text{где} \quad D_x A = \alpha(x, y, y')A.$$

Пример 1. Решим прямую задачу для ОДУ 2-го порядка

$$y'' = (xy^{-3} + x^{-1})y'$$

в классе операторов

$$X = A\partial_y,$$

где правило дифференцирования нелокальной переменной  $A$ :

$$D_x A = \alpha(x, y)A.$$

Соответствующее определяющее уравнение имеет вид

$$A [(\alpha'_y + 3xy^{-4})y' + \alpha'_x + \alpha^2 - (xy^{-3} + x^{-1})\alpha] = 0.$$

Расцепив по переменной  $y'$  выражение в квадратных скобках, получаем систему

$$\begin{cases} \alpha'_y + 3xy^{-4} = 0, \\ \alpha'_x + \alpha^2 - (xy^{-3} + x^{-1})\alpha = 0, \end{cases}$$

решением которой будет

$$\alpha = xy^{-3}.$$

Используя полученный результат, найдем дифференциальный инвариант допускаемого оператора  $J = J(x, y, y')$  из уравнения:

$$J_y + xy^{-3}J_{y'} = 0.$$

Его решение

$$J = y' + \frac{x}{2y^2}.$$

Отсюда вытекает, что исходное уравнение факторизуется следующим образом:

$$\begin{cases} u = y' + \frac{x}{2y^2}, \\ xu' - u = 0. \end{cases}$$

Если для ОДУ 2-го порядка мы по сути ищем допускаемые операторы в классе ЭНО, то для ОДУ более высоких порядков получаются операторы, координата которых не может быть восстановлена в явном виде, а следовательно, оператор не принадлежит к рассматриваемым до сих пор классам.

Рассмотрим ОДУ 3-го порядка

$$y''' = F(x, y, y', y'').$$

Это уравнение может быть факторизовано двумя способами (при условии сохранения в качестве независимой переменной  $x$ ):

$$(I) \begin{cases} u = J(x, y, y') \\ u'' = G(x, u, u') \end{cases}, \quad (II) \begin{cases} u = J(x, y, y', y'') \\ u' = G(x, u) \end{cases}.$$

Оказывается, что все факторсистемы вида (I) и только они могут быть найдены с помощью операторов вида

$$X = A\partial_y, \quad D_x A = \alpha(x, y, y')A.$$

Это опять по сути ЭНО. В этом случае инвариант  $J(x, y, y')$  удовлетворяет уравнению

$$J_y + \alpha J_{y'} = 0.$$

А все факторсистемы вида (II) и только они могут быть найдены с помощью операторов вида

$$X = A\partial_y, \quad D_x A = B, \quad D_x B = \alpha(x, y, y', y'')A + \beta(x, y, y', y'')B.$$

Инварианты  $J = J(x, y, y', y'')$  этого оператора удовлетворяют системе

$$\begin{cases} J_y + \alpha J_{y''} = 0, \\ J_{y'} + \beta J_{y''} = 0. \end{cases}$$

Чтобы эта система имела решение, отличное от тривиального (а только в этом случае оператор не будет “пустым”) необходимо добавить условие

$$\beta_y - \alpha_{y'} + \alpha\beta_{y''} - \beta\alpha_{y''} = 0.$$

Если бы мы задалась целью восстановить нелокальную переменную  $A$  и выяснить, к какому классу принадлежит рассматриваемый оператор, то нам пришлось бы решить линейное уравнение 2-го порядка в полных производных

$$D_x^2 A = \alpha(x, y, y', y'')A + \beta(x, y, y', y'')D_x A.$$

Но в общем случае мы такие уравнения решать не умеем.

Пример 2. Решим прямую задачу для ОДУ 3-го порядка

$$y''' + (y'')^2 + a(x, y)y'' + b(x, y)y' + c(x, y) = 0$$

в классе операторов

$$X = A\partial_y, \quad DA = B, \quad DB = \alpha(x, y)A + [\beta(x, y)y'' + \gamma(x, y)y' + \delta(x, y)]B$$

Определяющее уравнение для заданного оператора и уравнения вместе с условием наличия нетривиального инварианта после расщепления по нелокальным переменным  $A, B$  и дифференциальным переменным  $y', y''$  имеет вид:

$$\begin{cases} \beta^2 + \beta = 0, \\ \beta'_y = 0, \\ \gamma'_y = 0, \\ \gamma'_y + \gamma^2 = 0, \\ \delta'_y + \alpha\beta = 0, \\ c'_y + \alpha'_x + \alpha(a + \delta) = 0, \\ b'_y + \alpha'_y + \gamma\alpha = 0, \\ a'_y + \alpha(\beta + 2) = 0, \\ \delta'_x + \delta^2 + \delta a + \alpha - \beta c + b = 0, \\ \gamma'_x + \delta'_y + \gamma(2\delta + a) - \beta b = 0, \\ \beta'_x + 2\delta(1 + \beta) + \gamma = 0, \\ \beta'_y + 2\gamma(1 + \beta) = 0. \end{cases}$$

Эта система определяет следующие соотношения между координатами уравнения и неизвестными функциями в правилах дифференцирования

$$(I) \quad \delta = \beta = \gamma = 0, \quad \alpha = -\frac{1}{2}a'_y, \quad b = \frac{1}{2}a'_y, \quad c = \frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{2}a'_x + h(x);$$

$$(II) \quad c = a'_x - h'(x) + ah(x) - h(x)^2, \quad b = a'_y, \quad \alpha = -a'_y, \quad g = -a + h(x), \quad \beta = -1, \quad \gamma = 0.$$

Случаю (I) соответствует уравнению

$$y''' + (y'')^2 + ay'' + \frac{1}{2}a'_y y' + \frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{2}a'_x + h(x) = 0,$$

которое допускает оператор

$$X = A\partial_y, \quad DA = B, \quad DB = -\frac{1}{2}a'_y A,$$

инварианты которого порождают факторсистему этого уравнения

$$\begin{cases} u = y'' + \frac{1}{2}a, \\ u' + u^2 + h(x) = 0. \end{cases}$$

Случай (II) определяет уравнение

$$y''' + (y'')^2 + ay'' + a'_y y' + a'_x - h'_x + ah(x) - h(x)^2 = 0,$$

которое допускает оператор

$$X = A\partial_y, \quad DA = B, \quad DB = -a'_y A + (h(x) - y'' - a)B,$$

инварианты которого порождают факторсистему этого уравнения

$$\begin{cases} u = e^{y'}(y'' + a - h(x)), \\ u' + h(x)u = 0. \end{cases}$$

Таким образом, очевидно, что разработанный алгоритм не превосходит по сложности классический. Вместе с тем его возможности оказываются значительно более широкими, так как, например, факторизация уравнения примера 2 классическим алгоритмом вообще получено быть не может. Здесь координата формального канонического оператора удовлетворяет линейному уравнению в полных производных, решение которого в общем случае невозможно представить в квадратурах. Поэтому настоящий алгоритм реализует расширение набора “допустимых” функций для представления оператора и к тому же не требует исходных предположений относительно его формы.